



Présentation d'un Deuxième Cas d'une Ruminotomie Chez une vache Prim'Holstein


- Il s'agit d'une vache laitière Prim'Holstein âgée de 6 ans admise au service de reproduction et pathologie des ruminants de l'institut vétérinaire de Tiaret pour motif suivant :
 - Une chute de la production de lait.
 - La vache a tendance à s'isoler du troupeau et refuse parfois de manger.
- Après consultation rapprochée on a constaté que l'animal ne s'intéresse pas à son environnement.
- La respiration est accélérée et superficielle, de type costal par suite d'immobilisation réflexe du diaphragme.
- La rumination est irrégulière.
- Les contractions du rumen sont diminuées, ce qui a engendré une légère météorisation et une distension du flanc gauche.
- Les matières fécales sont dures et foncées rappelant des aliments mal digérés.
- Les symptômes généraux sont peu spécifiques : $T^{\circ} = (39,5 \text{ }^{\circ}\text{C})$ et légère tachycardie.
- Notre décision finale était de procéder à une ruminotomie qui va permettre de vérifier l'extension des lésions et donc d'affiner le diagnostic.
- Assurée Par Pr KHIATI et son équipe avec une groupe de la promotion (5^{ème} année de l'année en cours).




جامعة ابن خلدون تيارت
الكلية البيطرية
الجامعة الجزائرية
البيطرية
الكلية البيطرية
جامعة ابن خلدون تيارت
* علوم البيطرية *
* كلية البيطرية *










جامعة ابن خلدون تيارت *
الكلية الطبية
قسم الجراحة
الطبيب: د. محمد بن عبد الحميد
الطبيب المساعد: د. محمد بن عبد الحميد
الطبيب المساعد: د. محمد بن عبد الحميد





















3 semaines après l'intervention